

Cuidados para pacientes con:

CIRCUNCISIÓN

Es la cirugía que consiste en la extirpación parcial o total del prepucio, el pliegue móvil de piel que cubre y protege el glande del pene.

Las siguientes son las recomendaciones generales para el cuidado del paciente en la casa. Si después de leerlas o aplicarlas, presenta alguna inquietud, puede comunicarse al correo: educacionparalasalud.cub@upb.edu.co. Para conocer más sobre este y otros temas ingrese a www.clinicabolivariana.tv.

Recomendaciones:

- No coma ni tome nada hasta que pasen 6 horas de la cirugía.
- Al llegar a su casa puede tomar aromática, consomé y jugos no ácidos. Si no vomita, puede comer alimentos livianos. Al día siguiente la alimentación debe ser la que usted acostumbra.
- Si el paciente es un niño, ofrézcale agua; si no vomita, dele la alimentación como acostumbra.
- Guarde reposo en la cama durante el primer día de la cirugía.
- Utilice ropa amplia que no le roce los genitales. Si usa pañales que estos sean flojos.
- Si es un niño no debe usar juegos de montar (como triciclos, caballos de pasa tiempo, etc.).
- Para ayudar en la curación, retome sus actividades normales lo antes posible.
- Lave la incisión delicadamente con agua y jabón neutro a partir del día posterior de la cirugía (no frote el pene).
- Es normal que sienta molestias al orinar, debido a las suturas. Si presenta dificultad para orinar colóquese una bolsa de agua fría abajo del ombligo por tres minutos y luego una con agua tibia por tres minutos.

Consulte inmediatamente a su médico o acuda al Centro de Salud más cercano si presenta:

- Sangrando abundante o sangrado de olor fétido.
- Malestar general acompañado de temperatura mayor de 38.3°C o escalofrío.
- Abdomen grande o muy doloroso.
- Vómito de abundante cantidad.
- Cólicos fuertes y calambres.

Recuerde:

Para el éxito de su tratamiento es muy importante que usted tome todos los medicamentos ordenados, asista a las citas de control y cumpla estrictamente con estas recomendaciones.