

¿Qué ocurre si dejo de tomar el tratamiento?

- Puede haber fracaso en la terapia
- Complicación o muerte del paciente.
- Infectar otras personas sanas.
- Tratamientos prolongados.

La infección puede volverse multidrogo resistente (mdr), donde los antibióticos usuales pueden ser inefectivos.

- No suspender ni modificar el tratamiento sin orden médica.
- Tomar el medicamento siempre a la misma hora.
- Informar al médico todos los medicamentos que consume en su hogar.
- No ingerir licor durante el tratamiento.
- No automedicarse.
- Informar al médico si tiene alguna reacción luego de la toma de los antibióticos.
- No toser o estornudar sobre las personas.
- Mantener las habitaciones Ventiladas.
- Llevar una dieta rica en nutrientes y vitaminas.
- Realizar exámenes ordenados por el médico.

Protegemos el don maravilloso de la **vida**

Carrera 72A N° 78B - 50 | Conmutador 445 5900
clinica@upb.edu.co | www.clinicauniversitariabolivariana.org.co



Cuidados para los pacientes con tratamiento:

ANTITUBERCULOSO

¿Qué es la tuberculosis?

Es una infección producida por una bacteria que afecta principalmente los pulmones, es altamente contagiosa y su propagación se da directamente entre persona a persona.

Las siguientes son las recomendaciones generales para el cuidado del paciente en la casa. Si después de leerlas o aplicarlas, presenta alguna inquietud, puede comunicarse con la línea de atención farmacéutica: [445 5900](tel:4455900) + Ext. [9304](tel:9304) en el horario de [lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.](#)

Síntomas de la tuberculosis pulmonar

- Tos intensa por 3 semanas por tos con expectoración de dos semanas de evolución.
- Fiebre.
- Pérdida de peso.
- Sudoración nocturna.
- Expectoración con sangre.

Todo paciente diagnosticado con tuberculosis debe recibir el tratamiento con el fin de erradicar la infección y evitar posibles contagios.

El tratamiento consta de al menos 4 antibióticos que atacan el microorganismo desde distintos puntos para así erradicarlo.



Esquema de tratamiento

El médico es quien define la dosis, la cual depende del peso del paciente.

Fase	Esquema de tratamiento	# Dosis
PRIMERA Intensiva	Diaria LUNES A SÁBADO	56 DOSIS* *Dependiendo de la evaluación clínica del paciente.
SEGUNDA Fase de continuación	3 veces por semana 18 semanas	56 DOSIS* **Los medicamentos y el número de dosis pueden variar de acuerdo a cada paciente.

Tratamiento estrictamente supervisado

- Se elabora un plan para la toma del medicamento.
- El paciente se dirige al lugar asignado para administración de la dosis de acuerdo al plan.
- Se debe asistir siempre a la misma hora. (1 hora antes o 2 horas después de ingerir alimento).
- Se realiza seguimiento a la terapia.
- Se brinda asesoría sobre la enfermedad y tratamiento.

¿Los medicamentos tienen efectos secundarios?

Sí se pueden presentar efectos secundarios los cuales se espera que disminuyan y/o desaparezcan con el transcurso de los días.

Efectos secundarios más comunes:

- Trastornos gastrointestinales (Nauseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal).
- Cambio coloración orina (Amarillo intenso-naranja).

Hay algunos efectos adversos que pueden alterar las funciones del hígado, articulaciones, audición entre otros, para lo cual se debe consultar al médico.

¿Cuándo consultar al médico?

- Cuando hay mayor deterioro del estado de salud.
- Si la piel y/o los ojos toman coloración amarillenta.
- Si suspende el tratamiento.
- Al presentar picazón, brotes o enrojecimiento en la piel que no disminuyen.
- Si presenta vómito y dolor intenso en la parte alta del abdomen.
- Cuando se presente algún síntoma nuevo.